

**Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

*Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 5 dei 10 quesiti del questionario.***PROBLEMA 1**

Sia  $a$  un numero reale maggiore di zero e sia  $g$  la funzione definita, per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , da:  
 $g(x) = a^x + a^{-x}$ .

1. Si dimostri che, se  $a \neq 1$ ,  $g$  è strettamente crescente per  $x > 0$  e strettamente decrescente per  $x < 0$ .
2. Posto  $a = e$ , si disegni il grafico della funzione  $f(x) = e^x + e^{-x}$  e si disegni altresì il grafico della funzione  $\frac{1}{f(x)}$ .
3. Si calcoli  $\int_0^t \frac{1}{f(x)} dx$ ; successivamente, se ne trovi il limite per  $t \rightarrow \infty$  e si interpreti geometricamente il risultato.
4. Verificato che il risultato del limite di cui al punto precedente è  $\frac{\pi}{4}$ , si illustri una procedura numerica che consenta di approssimare tale valore.

**PROBLEMA 2**

Si considerino i triangoli la cui base è  $AB = 1$  e il cui vertice  $C$  varia in modo che l'angolo  $\widehat{CAB}$  si mantenga doppio dell'angolo  $\widehat{BCA}$ .

1. Riferito il piano ad un conveniente sistema di coordinate, si determini l'equazione del luogo geometrico  $\gamma$  descritto da  $C$ .
2. Si rappresenti  $\gamma$ , tenendo conto, ovviamente, delle prescritte condizioni geometriche.
3. Si determini l'ampiezza dell'angolo  $\widehat{BCA}$  che rende massima la somma dei quadrati delle altezze relative ai lati  $AC$  e  $BC$  e, con l'aiuto di una calcolatrice, se ne dia un valore approssimato in gradi e primi (sessagesimali).
4. Si provi che se  $\widehat{BCA} = 36^\circ$  allora è  $AC = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ .

**Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**

CORSO SPERIMENTALE

PIANO NAZIONALE INFORMATICA

Tema di: MATEMATICA

**QUESTIONARIO**

1. Si spieghi in che cosa consista il problema della quadratura del cerchio e se, e in che senso, si tratti di un problema risolvibile o meno.
2. La regione del piano racchiusa tra il grafico della funzione  $y = \ln x$  e l'asse  $x$ , con  $1 \leq x \leq e$ , è la base di un solido  $S$  le cui sezioni, ottenute tagliando  $S$  con piani perpendicolari all'asse  $x$ , sono tutte rettangoli aventi l'altezza tripla della base. Si calcoli il volume di  $S$  e se ne dia un valore approssimato a meno di  $10^{-2}$ .
3. Si dimostri che l'insieme delle *omotetie* con centro  $O$  fissato è un *gruppo*.
4. Si consideri la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Se ne spieghi l'importanza nelle applicazioni della matematica illustrando il significato di  $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $\sigma^2$  e come tali parametri influenzino il grafico di  $f(x)$ .

5. Si consideri il teorema: «*la somma degli angoli interni di un triangolo è un angolo piatto*» e si spieghi perché esso non è valido in un contesto di geometria *non-euclidea*. Quali le formulazioni nella geometria *iperbolica* e in quella *ellittica*? Si accompagni la spiegazione con il disegno.
6. Si scelga a caso un punto  $P$  all'interno di un triangolo equilatero il cui lato ha lunghezza 3. Si determini la probabilità che la distanza di  $P$  da ogni vertice sia maggiore di 1.
7. Si determini l'equazione del luogo geometrico dei centri delle circonferenze del piano tangenti alla parabola  $y = x^2 + 1$  nel punto  $(1, 2)$ .
8. A *Leonardo Eulero* (1707-1783), di cui quest'anno ricorre il terzo centenario della nascita, si deve il seguente problema: «Tre gentiluomini giocano insieme: nella prima partita il primo perde, a favore degli altri due, tanto denaro quanto ne possiede ciascuno di loro. Nella successiva, il secondo gentiluomo perde a favore di ciascuno degli altri due tanto denaro quanto essi già ne possiedono. Da ultimo, nella terza partita, il primo e il secondo guadagnano ciascuno dal terzo gentiluomo tanto denaro quanto ne avevano prima. A questo punto smettono e trovano che ciascuno ha la stessa somma, cioè 24 luigi. Si domanda con quanto denaro ciascuno si sedette a giocare».
9. Si dimostri che l'equazione  $2x^3 - 3x^2 + 6x + 6 = 0$  ha un'unica radice reale e si trovi il suo valore con una precisione di due cifre significative.
10. Per orientarsi sulla Terra si fa riferimento a *meridiani* e a *paralleli*, a *latitudini* e a *longitudini*. Supponendo che la Terra sia una sfera  $S$  e che l'asse di rotazione terrestre sia una retta  $r$  passante per il centro di  $S$ , come si può procedere per definire in termini geometrici meridiani e paralleli e introdurre un sistema di coordinate geografiche terrestri?

---

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.