Questionario

Quesito 1

Si narra che l'inventore del gioco degli scacchi chiedesse di essere compensato con chicchi di grano: un chicco sulla prima casella, due sulla seconda, quattro sulla terza e così via, sempre raddoppiando il numero dei chicchi, fino alla 64^a casella. Assumendo che 1000 chicchi pesino circa 38g, calcola il peso in tonnellate della quantità di grano pretesa dall'inventore.

Soluzione

Il numero N dei chicchi di grano è: $N = 1 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{63} = \sum_{n=0}^{63} 2^n$.

Si tratta di una serie geometrica di ragione 2.

La somma di tale serie è: $S = \sum_{n=0}^k q^n = \frac{q^{k+1} - 1}{q - 1}$ cioè: $S = \sum_{n=0}^{63} 2^n = \frac{2^{63+1} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1$.

Pertanto il peso in tonnellate della quantità di grano pretesa dall'inventore è:

$$P = \frac{2^{64} - 1}{1000} \cdot 38 \cdot 10^{-6} \text{ t} = \frac{2^{64} - 1}{10^9} \cdot 38 \text{ t} = 7,0098 \cdot 10^{11} \text{ t}.$$

Quesito 2

I poliedri regolari – noti anche come solidi platonici – sono, a meno di similitudini, solo cinque: il tetraedro, il cubo, l’ottaedro, il dodecaedro e l’icosaedro. Sai dimostrarlo?

Soluzione

Un poliedro si dice regolare se le sue facce sono poligoni regolari congruenti e i suoi angoloidi sono congruenti tra loro. Diversamente dagli analoghi poligoni regolari nel piano, che possono avere un infinito numero di lati, i poliedri regolari, nello spazio, sono solo cinque.

Infatti in ogni vertice del poliedro regolare devono concorrere almeno tre facce costituite da poligoni regolari e la somma degli angoli delle facce che si incontrano in tali vertici deve essere minore di 360 gradi; in caso contrario le facce si appiattirebbero in uno stesso piano.

Questo implica che non è possibile avere facce esagonali o con un numero maggiore di lati dato che questi poligoni hanno angoli interni maggiori di 120 gradi.

Pertanto:

- ✚ se le facce che concorrono in un vertice sono triangoli equilateri (angoli di 60°), si hanno tre casi:
 - 3 facce (somma degli angoli uguale a 180°) – TETRAEDRO (4 triangoli equilateri)
 - 4 facce (somma degli angoli uguale a 240°) – OTTAEDRO (8 triangoli equilateri)
 - 5 facce (somma degli angoli uguale a 300°) – ICOSAEDRO (20 triangoli equilateri)

Non si possono costruire poliedri regolari aventi 6 facce, perché la somma degli angoli è uguale a 360° , e quindi tassellano il piano.

- ✚ se le facce che concorrono in un vertice sono quadrati (angoli di 90°), si ha solo un caso:
 - 3 facce (somma degli angoli uguale a 270°) – CUBO o ESAEDRO (6 quadrati)

Non si possono costruire poliedri regolari aventi 4 facce, perché la somma degli angoli è uguale a 360° , e quindi tassellano il piano.

- ✚ se le facce che concorrono in un vertice sono pentagoni regolari (angoli di 108°) si ha solo un caso:
 - 3 facce (somma degli angoli uguale a 324°) – DODECAEDRO (12 pentagoni regolari).

Non si possono costruire poliedri regolari aventi 4 facce, perché la somma degli angoli è uguale a 432° , e quindi il poliedro è irrealizzabile.

- ✚ Non si possono costruire poliedri regolari aventi facce costituite da esagoni regolari (angoli di 120°), perché 3 esagoni regolari tassellano il piano.

I cinque corpi regolari

Tetraedro 4 facce triangolari 6 spigoli 4 vertici	Cubo 6 facce quadrate 12 spigoli 8 vertici	Ottaedro 8 facce triangolari 12 spigoli 6 vertici	Icosaedro 20 facce triangolari 30 spigoli 12 vertici	Dodecaedro 12 facce pentagonali 30 spigoli 20 vertici

Proclo, storico della matematica del V secolo dopo Cristo, attribuisce a Pitagora la scoperta dei 5 poliedri regolari.

Platone userà questa straordinaria scoperta come simbologia dell’universo e dei suoi elementi base: il fuoco (tetraedro), la terra (cubo), l’aria (ottaedro) e l’acqua (l’icosaedro). Il quinto poliedro regolare, il dodecaedro, era a simboleggiare la quinta essenza che tutto avvolge e comprende. La metafora ha un qualche senso matematico dato che è possibile dimostrare che l’unico poliedro regolare nel quale sia possibile inscrivere gli altri 4 è il dodecaedro. Questa tradizione neo-platonica resterà viva fino a Keplero che credette di poter descrivere i moti dei pianeti in termini di poliedri e loro reciproche inclusioni.

Quesito 3

In un piano sono dati una retta r e due punti A e B ad essa esterni ma situati nel medesimo semipiano di origine r . Si trovi il più breve cammino che congiunga A con B toccando r .

Soluzione

Costruiamo il simmetrico A' del punto A rispetto alla retta r .

Evidentemente se si considerano i punti A' e B , anziché A e B , il minimo cammino che li congiunge è il segmento che li ha per estremi, cioè:

$$\overline{A'B} = \overline{A'C} + \overline{BC} \quad \text{ma} \quad \overline{A'C} = \overline{AC}.$$

Pertanto il più breve cammino che congiunga A con B toccando r è: $\overline{AC} + \overline{BC}$.

Infatti prendendo un qualsiasi altro punto C_1 sulla retta r , per la nota disuguaglianza triangolare (in un triangolo la somma di due lati è maggiore del terzo), si ha che: $\overline{AC_1} + \overline{C_1B} = \overline{A'C_1} + \overline{C_1B} > \overline{A'B} = \overline{AC} + \overline{BC}$.

Quesito 4

Si dimostri che l'equazione $\sin x = x - 1$ ha una e una sola radice α e, utilizzando una calcolatrice tascabile, se ne dia una stima. Si descriva altresì una procedura di calcolo che consenta di approssimare α con la precisione voluta.

Soluzione

Risolvere l'equazione $\sin x = x - 1$

equivale a risolvere il sistema:
$$\begin{cases} y = \sin x \\ y = x - 1 \end{cases}$$

Dalla rappresentazione grafica delle due curve si evince che le due curve hanno un solo punto di intersezione.

Tale soluzione, in una prima approssimazione, si trova nell'intervallo $(1, 2)$.

Per dimostrare che l'equazione $\sin x = x - 1$ ha una e una sola radice α , consideriamo la funzione:

$$h(x) = 1 - x + \sin x \quad \text{definita e continua } \forall x \in \mathbb{R}.$$

La derivata prima è: $h'(x) = -1 + \cos x$.

$h'(x) > 0$; $-1 + \cos x > 0$; $\cos x > 1$ mai verificata. Quindi $h'(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

La funzione è quindi decrescente in tutto il suo dominio.

Essendo inoltre, $h(1) = 1 - 1 + \sin 1 > 0$ e $h(2) = 1 - 2 + \sin 2 = -1 + 0,9 < 0$ per il teorema dell'esistenza degli zeri tale soluzione α esiste ed è unica.

Utilizzando il metodo di bisezione si ha:

Metodo di bisezione

$$h(x) = 1 - x + \sin x$$

Approssimazione **0,01**

x_1	x_2	x_m	Segno di $h(x)$ in x_1	Segno di $h(x)$ in x_2	Segno di $h(x)$ in x_m	Δx	Verifica Approssimazione
1	2	1,5	1	-1	1	1	continua
1,5	2	1,75	1	-1	1	0,5	continua
1,75	2	1,875	1	-1	1	0,25	continua
1,875	2	1,938	1	-1	-1	0,125	continua
1,875	1,938	1,906	1	-1	1	0,0625	continua
1,906	1,938	1,922	1	-1	1	0,0313	continua
1,9219	1,9375	1,9297	1	-1	1	0,0156	continua
1,9297	1,9375	1,9336	1	-1	1	0,0078	STOP
1,9336	1,9375	1,93					0,0078 < 0,01

Quesito 5

Si dimostri che la somma dei coefficienti dello sviluppo di $(a + b)^n$ è uguale a 2^n per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Soluzione

Ricordando che la potenza del binomio:

$$(a + b)^n = k_0 a^n b^0 + k_1 a^{n-1} b + k_2 a^{n-2} b^2 + \dots + k_{n-1} a^1 b^{n-1} + k_n a^0 b^n$$

dove $k_0, k_1, k_2, \dots, k_{n-1}, k_n$ sono i coefficienti dello sviluppo di $(a + b)^n$.

Ponendo in questa formula $a = 1$ e $b = 1$ si ottiene:

$$(1 + 1)^n = k_0 \cdot 1^n \cdot 1^0 + k_1 \cdot 1^{n-1} \cdot 1 + k_2 \cdot 1^{n-2} \cdot 1^2 + \dots + k_{n-1} \cdot 1^1 \cdot 1^{n-1} + k_n \cdot 1^0 \cdot 1^n \quad \text{cioè:}$$

$$2^n = k_0 + k_1 + k_2 + \dots + k_{n-1} + k_n \quad \text{c.v.d.}$$

Quesito 6

L'equazione risolvente un dato problema è: $k \cos 2x - 5k + 2 = 0$ dove k è un parametro reale e x ha le seguenti limitazioni: $15^\circ < x < 45^\circ$. Si discuta per quali valori di k le radici dell'equazione siano soluzioni del problema.

Soluzione 1

La limitazione $15^\circ < x < 45^\circ$ si traduce nella limitazione: $30^\circ < 2x < 90^\circ$.

Ponendo $2x = t$ e ricordando che $k \neq 0$ (altrimenti si ha $2 = 0$ e l'equazione è impossibile)

si ha che l'equazione $k \cos 2x - 5k + 2 = 0$ si trasforma in: $k \cos t - 5k + 2 = 0$; $\cos t = \frac{5k - 2}{k}$

che equivale al sistema:

$$\begin{cases} y = \cos t \\ y = \frac{5k - 2}{k} \\ 30^\circ < t < 90^\circ \end{cases}$$

Essendo: $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos 90^\circ = 0$

ed essendo il coseno una funzione decrescente nell'intervallo $(30^\circ, 90^\circ)$ si ha che:

$$30^\circ < t < 90^\circ \Rightarrow \cos 90^\circ < \cos t < \cos 30^\circ; \quad 0 < \frac{5k - 2}{k} < \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \text{che equivale al sistema:}$$

$$\begin{cases} \frac{5k - 2}{k} > 0 \\ \frac{5k - 2}{k} < \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{5k - 2}{k} > 0 \\ \frac{10k - 4 - \sqrt{3}k}{2k} < 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{5k - 2}{k} > 0 \\ \frac{(10 - \sqrt{3})k - 4}{2k} < 0 \end{cases}$$

Calcoli

Risoluzione della disequazione:

Risoluzione della disequazione:

Soluzione 2

L'equazione $\cos t = \frac{5k-2}{k}$ si può interpretare come l'intersezione tra le curve $y = \cos t$ e $y = \frac{5k-2}{k}$ (fascio di rette orizzontali) nell'intervallo $30^\circ < t < 90^\circ$,

cioè il sistema:

$$\begin{cases} y = \cos t \\ y = \frac{5k-2}{k} \\ 30^\circ < t < 90^\circ \end{cases}$$

Essendo:

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5k-2}{k}; \quad \sqrt{3}k = 10k - 4; \quad (\sqrt{3} - 10)k = -4; \quad k = \frac{4}{10 - \sqrt{3}} \approx 0,48.$$

$$\cos 90^\circ = 0 \Rightarrow 0 = \frac{5k-2}{k}; \quad \frac{2}{k} = 5; \quad k = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Si deduce che:

per $k = \frac{4}{10 - \sqrt{3}}$ si ottiene la retta passante per il punto A.

per $k = \frac{2}{5}$ si ottiene la retta passante per il punto B.

La retta del fascio incontra la curva $y = \cos t$ sempre in un punto per: $\frac{2}{5} < k < \frac{4}{10 - \sqrt{3}}$.

Quesito 7

Bruno de Finetti (1906-1985), tra i più illustri matematici italiani del secolo scorso, del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita, alla domanda: "che cos'è la probabilità?" era solito rispondere: "la probabilità non esiste!". Quale significato puoi attribuire a tale risposta?

E' possibile collegarla ad una delle diverse definizioni di probabilità che sono state storicamente proposte?

Soluzione

Negli anni i matematici hanno dato diverse definizioni di probabilità:

- ✚ La definizione classica di probabilità di un evento, data dal rapporto tra i casi favorevoli all'evento e quelli possibili, è applicabile quando questo conteggio diviene possibile ma ciò non è sempre realizzabile.
- ✚ La definizione frequentista che considera la probabilità di un evento come la frequenza calcolata su un numero sufficientemente elevato di prove, si può applicare quando gli eventi siano ripetibili e per i quali si possa disporre di conteggi che informino su quante volte un evento si è verificato in un numero elevato di prove.

Vi sono però eventi che non rientrano in nessuna delle precedenti due definizioni: per questo De Finetti affermava che: "la probabilità non esiste!".

Infatti ad un evento del tipo: "domani, alla finale della coppa del mondo di calcio, l'Italia batte la Francia" non è possibile assegnare con le precedenti definizioni alcun valore di probabilità.

Tale limitatezza viene superata dalla definizione soggettivista che afferma che la probabilità di un evento è la misura della fiducia che un individuo coerente attribuisce al verificarsi di tale evento. Nella interpretazione di De Finetti tale definizione diventa: "la probabilità di un evento è quel valore o prezzo p ($0 < p < 1$) che un individuo, che procede alla valutazione secondo le sue informazioni e opinioni, ritiene equo pagare per ricevere una vincita pari ad 1 nel caso si verifichi l'evento.

Più semplicemente, riprendendo l'esempio precedente, un Tizio che valuta al 40% la possibilità che l'Italia vinca la partita contro il Brasile, significa che è disposto a scommettere 40€ in cambio di una vincita di 100€ qualora l'Italia vincessesse.

Quesito 8

Un tiratore spara ripetutamente ad un bersaglio; la probabilità di colpirlo è di 0,3 per ciascun tiro. Quanti tiri deve fare per avere probabilità $\geq 0,99$ di colpirlo almeno una volta?

Soluzione

Essendo $p = 0,3$ la probabilità di colpire il bersaglio per ciascun tiro, implica che la probabilità di non colpire il bersaglio per ciascun tiro è: $q = 1 - p = 1 - 0,3 = 0,7$.

Quindi la probabilità che non colpisca mai il bersaglio in n tiri è: $q_n = q^n = 0,7^n$.

Oppure con la formula: $q_n = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} = \binom{n}{0} \cdot 0,3^0 \cdot 0,7^{n-0} = 1 \cdot 1 \cdot 0,7^n = 0,7^n$

Pertanto la probabilità che colpisca almeno una volta il bersaglio in n tiri è: $p_n = 1 - q^n = 1 - 0,7^n$.

Per determinare il numero dei tiri che deve fare il tiratore affinché la probabilità di colpirlo almeno una volta sia $\geq 0,99$, occorre risolvere la disequazione: $1 - 0,7^n \geq 0,99$.

$1 - 0,7^n \geq 0,99$; $0,7^n \leq 1 - 0,99$; $0,7^n \leq 0,01$; applicando il $\log_e x$ ad ambo i membri, si ha:

$\log_e 0,7^n \leq \log_e 0,01$; $n \cdot \log_e 0,7 \leq \log_e 0,01$; dividendo per $\log_e 0,7 < 0$ il segno di disuguaglianza **si inverte**

$$n \geq \frac{\log_e 0,01}{\log_e 0,7} \approx 12,9.$$

In definitiva il tiratore deve fare 13 tiri affinché la probabilità di colpirlo almeno una volta sia $\geq 0,99$.

Quesito 9

Della funzione $f(x)$ si sa che è derivabile e diversa da zero in ogni punto del suo dominio e, ancora, che: $f'(x) = f(x)$ e $f(0) = 1$. Puoi determinare $f(x)$?

Soluzione

Il quesito non è ben formulato, perché non è stato specificato chiaramente il dominio della funzione.

Comunque, leggendo nel pensiero di chi ha formulato la domanda, si può procedere nel seguente modo:

Essendo la funzione $f(x)$ derivabile in ogni punto del suo dominio, essa è anche continua in ogni punto del suo dominio. Essendo inoltre sempre diversa da zero, con $f(0) = 1 > 0$, essa è sempre positiva in ogni punto del suo dominio.

Il problema sintetizzato nella forma: $\begin{cases} f'(x) = f(x) \\ f(0) = 1 \end{cases}$ rappresenta il classico problema di Cauchy.

Essendo $f(x) \neq 0$, l'equazione differenziale $f'(x) = f(x)$, può essere riscritta nella forma: $\frac{f'(x)}{f(x)} = 1$.

Integrando ambo i membri in dx si ricava: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int dx$ cioè $\log |f(x)| = x + k$.

Essendo $f(x) > 0$ in ogni punto del suo dominio, l'ultima uguaglianza diventa: $\log f(x) = x + k$

Dalla definizione di logaritmo si ottiene: $f(x) = e^{x+k}$ che si può riscrivere come: $f(x) = e^k \cdot e^x$ (*)

Applicando la condizione iniziale: $f(0) = 1$ si ricava: $f(0) = e^{0+k}$; $1 = e^k$

Sostituendo tale risultato nella soluzione generale si ottiene: $f(x) = 1 \cdot e^x$ cioè $f(x) = e^x$.

Quesito 10

Tenuto conto che: $\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ calcola un'approssimazione di π utilizzando uno dei metodi di integrazione numerica studiati.

Soluzione

Dalla relazione della traccia si ricava: $\pi = 4 \cdot \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$

Per determinare un'approssimazione dell'integrale $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ si può utilizzare la formula dei trapezi o di Bezout:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{n} \cdot \left[\frac{f(a)+f(b)}{2} + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}) \right] \quad \text{dividendo l'intervallo } [0,1] \text{ in 5 intervalli di ampiezza } 0,2 .$$

Calcoliamo innanzitutto i valori:

$$f(0) = \frac{1}{1+0^2} = 1; \quad f(0,2) = \frac{1}{1+\left(\frac{2}{10}\right)^2} = \frac{25}{26}; \quad f(0,4) = \frac{1}{1+\left(\frac{4}{10}\right)^2} = \frac{25}{29};$$

$$f(0,6) = \frac{1}{1+\left(\frac{6}{10}\right)^2} = \frac{25}{34}; \quad f(0,8) = \frac{1}{1+\left(\frac{8}{10}\right)^2} = \frac{25}{41}; \quad f(1) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left[\frac{1+\frac{1}{2}}{2} + \frac{25}{26} + \frac{25}{29} + \frac{25}{34} + \frac{25}{41} \right] = \frac{1}{5} \cdot \left[\frac{3}{4} + \frac{25}{26} + \frac{25}{29} + \frac{25}{34} + \frac{25}{41} \right] = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left[\frac{788307 + 1010650 + 906100 + 772850 + 640900}{1051076} \right] = \frac{1}{5} \cdot \frac{4118807}{1051076} \approx 0,7837315 \end{aligned}$$

Pertanto $\pi = 4 \cdot 0,7837315 \approx 3,1349261$

Tale valore differisce per meno di un centesimo dal valore di π .

Infatti: $\pi - 3,1349261 = 3,1415927 - 3,1349261 = 0,0066665 < 0,001$.